02/2024

CONPACK SANI

DESCRIPTION DU PRODUIT

Désinfectant concentré du linge.
Approprié pour une utilisation en phase de décontamination.
Emballage respectueux de l'environnement.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

- Liquide de couleur jaune fluorescent.
- Densité à 20ºC : 1,06 ± 0,02 g/mL.
- pH à 1 % : 10,8 ± 0,5.

CARACTÉRISTIQUES

- Large spectre biocide, grâce à l'action synergique du désinfectant à base d'ammonium quaternaire avec les autres composants de la formulation.
- Désinfectant à effet rémanent. Empêche la prolifération de microorganismes dans le tissu suite aux manipulations après le processus de lavage.
- Grand pouvoir mouillant et de pénétration grâce aux propriétés tensioactives de ses composants qui le rendent très efficace sur tout type de tissus.
- Approprié pour tout type de textiles : coton, laine, synthétiques, blanc et de couleur.
- Produit non oxydant. Protection maximale des tissus.
- Conserve son activité désinfectante en présence de matière organique.
- Haut pouvoir séquestrant. Efficace dans toutes les duretés de l'eau (douce, moyenne, dure). Les caractéristiques de l'eau de lavage n'altèrent pas les propriétés du produit et ne diminuent pas son rendement.
- Application facile manuellement ou avec des systèmes automatisés.
- Totalement soluble dans l'eau.
- Facile à rincer.
- Efficace à basses températures.
- Très économique grâce à ses faibles doses d'emploi.
- ACTIVITÉ DÉSINFECTANTE :
  Selon les études réalisées, le produit est conforme à :
  - **Secteur désinfection textiles**
    - Bactéricide
      - ASTM E2274-16, 20 ºC, 1%, 15 min, *Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae*.
      - EN 1276, 20 ºC, 0,25 %, 5 min, 0,3 g/l BSA, Escherichia coli, Enterococcus hirae, staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa.
  - **Secteur alimentaire, industriel et institutionnel**
    - Bactéricide
      - EN 1276, 20 ºC, 2 %, 1 min, 3,0 g/l BSA, *Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus,* P*seudomonas aeruginosa.*
      - EN 1276, 20 ºC, 1 %, 2 min, 3,0 g/l BSA, *Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus,* P*seudomonas aeruginosa.*
      - EN 1276, 20 ºC, 1,5 %, 5 min, 10,0 g/l skimmed milk, *Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus,* P*seudomonas aeruginosa.*
      - EN 1276, 20 ºC, 1 %, 5 min, 10,0 g/l sucrose, *Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus,* P*seudomonas aeruginosa.*
      - EN 1276, 20 ºC, 1,5 %, 5 min, 10,0 g/l Yeast Extract, *Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus,* P*seudomonas aeruginosa.*
      - EN 1276, 20 ºC, 0,5 %, 5 min, 3,0 g/l BSA, *Listeria monocytogenes, Salmonella Typhimurium.*
      - EN 13697, 20 ºC, 4 %, 1 min, 3,0 g/l BSA, *Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus,* P*seudomonas aeruginosa.*
      - EN 13697, 20 ºC, 3 %, 2 min, 3,0 g/l BSA, *Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus,* P*seudomonas aeruginosa.*

Cette fiche est fournie à titre d'information.
Elle peut être modifiée sans préavis.
PROQUIMIA, S.A. décline toute responsabilité pour une utilisation non conforme.

- EN 13697, 20 ºC, 2 %, 5 min, 3,0 g/l BSA, *Escherichia coli*, *Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus,* P*seudomonas aeruginosa.*
- EN 13697, 20 ºC, 1,5 %, 5 min, 3,0 g/l BSA, *Listeria monocytogenes*.
- EN 13697, 20 ºC, 3 %, 5 min, 3,0 g/l BSA, *Salmonella Typhimurium*.
- EN 16615, 20 ºC, 1 %, 1 min, 3,0 g/l BSA + 3,0 g/l Erythrocytes, *Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus,* P*seudomonas aeruginosa.*
- EN 14561, 20 ºC, 2,5 %, 15 min, 0,3 g/l BSA, *Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus,* P*seudomonas aeruginosa.*
- EN 13697, 20 ºC, 0,25 %, 30 min, 3,0 g/l BSA, *Escherichia coli*, *Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus,* P*seudomonas aeruginosa.*
- EN 13727, 20 ºC, 0,1 %, 60 min, 3,0 g/l BSA + 3,0 g/l Erythrocytes, *Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus.*

- Levuricide
  - EN 1650, 20 ºC, 2,0 %, 1 min, 3,0 g/l BSA, *Candida albicans*.
  - EN 1650, 20 ºC, 1,0 %, 5 min, 3,0 g/l BSA, *Candida albicans*.
  - EN 1650, 20 ºC, 0,5 %, 15 min, 3,0 g/l BSA, *Candida albicans*.
  - EN 13697, 20 ºC, 4,0 %, 5 min, 3,0 g/l BSA, *Candida albicans*.
  - EN 13697, 20 ºC, 3,0 %, 15 min, 3,0 g/l BSA, *Candida albicans*.
  - EN 13697, 20 ºC, 2,0 %, 30 min, 3,0 g/l BSA, *Candida albicans*.
  - EN 16615, 20 ºC, 1,0 %, 1 min, 3,0 g/l BSA + 3,0 g/l Erythrocytes, *Candida albicans*.
  - EN 14562, 20 ºC, 3,0 %, 15 min, 0,3 g/l BSA, *Candida albicans*.
  - EN 13697, 20 ºC, 0,25 %, 60 min, 3,0 g/l BSA, *Candida albicans*.
  - EN 13624, 20 ºC, 0,1 %, 60 min, 3,0 g/l BSA + 3,0 g/l Erythrocytes, *Candida albicans*.
- Fongicide
  - EN 1650, 20 ºC, 4,0 %, 30 min, 0,3 g/l BSA, *Aspergillus brasiliensis (A. niger).*
  - EN 1650, 20 ºC, 4,0 %, 60 min, 0,3 g/l BSA, *Aspergillus brasiliensis (A. niger).*
  - EN 16615, 20 ºC, 2,0 %, 15 min, 0,3 g/l BSA, *Aspergillus brasiliensis (A. niger).*
- Virucide
  - EN 13610, 20 ºC, 3,0 %, 15 min, 10,0 g/l skimmed milk, *Lactococcus lactis subsp. Lactis phage P001, Lactococcus lactis subsp. Lactis phage P008.*
  - EN 14476, 20 ºC, 2,0 %, 5 min, 0,3 g/l BSA, *Murine norovirus*.
  - EN 14476, 20 ºC, 2,0 %, 15 min, 3,0 g/l BSA + 3,0 g/l Erythrocytes, *Murine norovirus*.
  - EN 14476, 20 ºC, 3,0 %, 5 min, 0,3 g/l BSA, *Adenovirus type 5 strain Adenoid 75*.
  - EN 14476, 20 ºC, 5,0 %, 5 min, 3,0 g/l BSA + 3,0 g/l Erythrocytes, *Adenovirus type 5*.
  - EN 16777, 20 ºC, 5,0 %, 30 min, 0,3 g/l BSA, *Murine norovirus, Adenovirus type 5*.
  - EN 14476, 20 ºC, 1,0 %, 5 min, 3,0 g/l BSA + 3,0 g/l Erythrocytes, *Modified Virus Vaccina Ankara (MVA)*.
  - EN 14476, 20 ºC, 4,0 %, 1 min, 0,3 g/l BSA, *Modified Virus Vaccina Ankara (MVA).*
  - EN 14476, 20 ºC, 0,5 %, 5 min, 3,0 g/l BSA + 3,0 g/l Erythrocytes, *Influenza A Virus (H1N1), Influenza A Virus (H7N9)*.
  - EN 16777, 20 ºC, 3,0 %, 5 min, 0,3 g/l BSA, *Modified Virus Vaccina Ankara (MVA).*
  - EN 16777, 20 ºC, 2,0 %, 10 min, 0,3 g/l BSA, *Modified Virus Vaccina Ankara (MVA).*
  - EN 16777, 20 ºC, 4,0 %, 1 min, 0,3 g/l BSA, *Modified Virus Vaccina Ankara (MVA).*
  - EN 16777, 20 ºC, 4,0 %, 5 min, 3,0 g/l BSA, *Modified Virus Vaccina Ankara (MVA).*
  - EN 17111, 20 ºC, 1,0 %, 15 min, 0,3 g/l BSA, *Modified Virus Vaccina Ankara (MVA).*

- **Secteur médical**
  - Bactéricide
    - EN 13727, 20 ºC, 2 %, 1 min, 3,0 g/l BSA+ 3,0 g/l Erythrocytes, *Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus,* P*seudomonas aeruginosa.*
    - EN 13727, 20 ºC, 2 %, 5 min, 3,0 g/l BSA+ 3,0 g/l Erythrocytes, *Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus,* P*seudomonas aeruginosa.*
    - EN 13727, 20 ºC, 1 %, 60 min, 3,0 g/l BSA+ 3,0 g/l Erythrocytes, *Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus,* P*seudomonas aeruginosa.*
    - EN 13727, 20 ºC, 0,5 %, 1 min, 3,0 g/l BSA+ 3,0 g/l Erythrocytes, *P. hauseri.*
    - EN 13697, 20 ºC, 3 %, 5 min, 3,0 g/l BSA+ 3,0 g/l Erythrocytes, *Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus,* P*seudomonas aeruginosa.*
    - EN 13697, 20 ºC, 1 %, 60 min, 3,0 g/l BSA+ 3,0 g/l Erythrocytes, *Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus,* P*seudomonas aeruginosa.*
    - EN 16615, 20 ºC, 1 %, 1 min, 3,0 g/l BSA+ 3,0 g/l Erythrocytes, *Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus,* P*seudomonas aeruginosa.*
    - EN 16615, 20 ºC, 1 %, 1 min, 3,0 g/l BSA+ 3,0 g/l Erythrocytes, *P. hauseri.*
  - Levuricide
    - EN 13624, 20 ºC, 4 %, 1 min, 3,0 g/l BSA+ 3,0 g/l Erythrocytes, *Candida albicans.*
    - EN 13624, 20 ºC, 1 %, 5 min, 3,0 g/l BSA+ 3,0 g/l Erythrocytes, *Candida albicans.*

Cette fiche est fournie à titre d'information.
Elle peut être modifiée sans préavis.
PROQUIMIA, S.A. décline toute responsabilité pour une utilisation non conforme.

        - EN 13624, 20 ºC, 0,25 %, 60 min, 3,0 g/l BSA+ 3,0 g/l Erythrocytes, *Candida albicans.*
        - EN 13697, 20 ºC, 3 %, 5 min, 3,0 g/l BSA+ 3,0 g/l Erythrocytes, *Candida albicans.*
        - EN 13697, 20 ºC, 1 %, 60 min, 3,0 g/l BSA+ 3,0 g/l Erythrocytes, *Candida albicans.*
        - EN 16615, 20 ºC, 1 %, 1 min, 3,0 g/l BSA+ 3,0 g/l Erythrocytes, *Candida albicans.*
    - Fongicide
        - EN 1650, 20 ºC, 4 %, 30 min, 0,3 g/l BSA, *Aspergillus brasiliensis (A. niger).*
        - EN 1650, 20 ºC, 4 %, 60 min, 0,3 g/l BSA, *Aspergillus brasiliensis (A. niger).*
        - EN 16615, 20 ºC, 2 %, 15 min, 0,3 g/l BSA, *Aspergillus brasiliensis (A. niger).*
    - Virucide
        - EN 14476, 20 ºC, 5 %, 60 min, 3,0 g/l BSA+3,0 g/l Erythrocytes, *Poliovirus Type 1.*
        - EN 14476, 20 ºC, 3 %, 5 min, 0,3 g/l BSA, *Adenovirus Type 5.*
        - EN 14476, 20 ºC, 5 %, 5 min, 3,0 g/l BSA+3,0 g/l Erythrocytes, *Adenovirus Type 5.*
        - EN 14476, 20 ºC, 2 %, 5 min, 0,3 g/l BSA, *Murine Norovirus.*
        - EN 14476, 20 ºC, 2 %, 15 min, 3,0 g/l BSA+3,0 g/l Erythrocytes, *Murine Norovirus.*
        - EN 16777, 20 ºC, 8 %, 30 min, 0,3 g/l BSA, *Murine Norovirus, Adenovirus Type 5.*
        - EN 16777, 20 ºC, 8 %, 60 min, 0,3 g/l BSA, *Murine Norovirus, Adenovirus Type 5.*
        - EN 14476, 20 ºC, 2 %, 5 min, 0,3 g/l BSA, *Murine Norovirus.*
        - EN 14476, 20 ºC, 2 %, 15 min, 3,0 g/l BSA+3,0 g/l Erythrocytes, *Murine Norovirus.*
        - EN 14476, 20 ºC, 3 %, 5 min, 0,3 g/l BSA, *Adenovirus Type 5.*
        - EN 14476, 20 ºC, 5 %, 5 min, 3,0 g/l BSA+ 3,0 g/l Erythrocytes, *Adenovirus Type 5.*
        - EN 16777, 20 ºC, 5 %, 30 min, 0,3 g/l BSA, *Murine Norovirus, Adenovirus Type 5.*
        - EN 14476, 20 ºC, 1 %, 5 min, 3,0 g/l BSA+3,0 g/l Erythrocytes, *Modified Virus Vaccina Ankara (MVA).*
        - EN 14476, 20 ºC, 4 %, 1 min, 0,3 g/l BSA, *Modified Virus Vaccina Ankara (MVA).*
        - EN 14476, 20 ºC, 0,5 %, 5 min, 3,0 g/l BSA+3,0 g/l Erythrocytes, *Influenza A Virus (H1N1), Influenza A Virus (H7N9).*
        - EN 14476, 20 ºC, 5 %, 5 min, 3,0 g/l BSA+3,0 g/l Erythrocytes, Duck Hepatitis B.
        - EN 14476, 20 ºC, 1 %, 1 min, 0,3 g/l BSA, *Bovine Corona Virus (surrogated Coronavirus family: MERS-CoV, SARS-CoV-2).*
        - EN 16777, 20 ºC, 3 %, 5 min, 0,3 g/l BSA, *Modified Virus Vaccina Ankara (MVA).*
        - EN 16777, 20 ºC, 2 %, 10 min, 0,3 g/l BSA, *Modified Virus Vaccina Ankara (MVA).*
        - EN 16777, 20 ºC, 4 %, 1 min, 0,3 g/l BSA, *Modified Virus Vaccina Ankara (MVA).*
        - EN 16777, 20 ºC, 4 %, 5 min, 3 g/l BSA, *Modified Virus Vaccina Ankara (MVA).*
- **Secteur vétérinaire :**
    - Bactéricide
        - EN 1656, 10 ºC, 4 %, 30 min, 10,0 g/l BSA+10,0 g/l Yeast Extract, *Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus,* P*seudomonas aeruginosa, P. hauseris.*
        - EN 1656, 10 ºC, 1 %, 5 min, 3,0 g/l BSA, *Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus,* P*seudomonas aeruginosa, P. hauseri.*
        - EN 1656, 10 ºC, 1 %, 30 min, 3,0 g/l BSA, *Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus,* P*seudomonas aeruginosa, P. hauseri.*
        - EN 14349, 10 ºC, 6 %, 30 min, 10,0 g/l BSA+10,0 g/l Yeast Extract, *Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus,* P*seudomonas aeruginosa, P. hauseri.*
        - EN 14349, 10 ºC, 3 %, 5 min, 3,0 g/l BSA, *Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus,* P*seudomonas aeruginosa, P. hauseri.*
        - EN 14349, 10 ºC, 2 %, 15 min, 3,0 g/l BSA, *Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus,* P*seudomonas aeruginosa, P. hauseri.*
    - Levuricide
        - EN 1657, 10 ºC, 2 %, 30 min, 10,0 g/l BSA+10,0 g/l Yeast Extract, *Candida albicans.*
        - EN 1657, 10 ºC, 0,1 %, 5 min, 3,0 g/l BSA, *Candida albicans.*
        - EN 16438, 10 ºC, 2 %, 30 min, 10,0 g/l BSA+10,0 g/l Yeast Extract, *Candida albicans.*
        - EN 16438, 10 ºC, 2 %, 15 min, 3,0 g/l BSA, *Candida albicans.*
    - Virucide
        - EN 14675, 10 ºC, 6 %, 15 min, 3,0 g/l BSA, *Enterovirus E (Bovine enterovirus Type 1).*
        - EN 14675, 10 ºC, 3 %, 30 min, 10,0 g/l BSA+10,0 g/l Yeast Extract, *Modified Virus Vaccina Ankara (MVA).*
        - EN 17122, 10 ºC, 2 %, 5 min, 3,0 g/l BSA, *Feline Coronavirus.*
    - L'activité virucide face à Modified Vaccinia Ankara (MVA) indique que le produit a une activité virucide faces aux virus enveloppés.
    - Le respect de la norme UNE-EN 14675:2015 avec le Modified Virus Vaccina Ankara (MVA), garantit l'efficacité du produit face au virus de la peste porcine africaine, responsable de la peste porcine africaine.
- Incompatible avec les composants anioniques et les produits chlorés.
- Produit écologique, développé sous les critères du développement durable :
    - Produit formulé sans phosphates.

Cette fiche est fournie à titre d'information.
Elle peut être modifiée sans préavis.
PROQUIMIA, S.A. décline toute responsabilité pour une utilisation non conforme.

- Conditionné sous le système CONPACK, qui réduit les déchets de type emballage plastiques durs et minimise les risques dérivés de la manipulation de produits chimiques.
- Produit concentré qui assure un haut rendement lors de l'application. En même temps, minimise les émissions de CO_2 dérivées du transport : sa formulation concentrée nécessite une moindre quantité de matière à transporter.

- Compatibilité avec d'autres matériaux :
  - Compatible avec la plupart des surfaces métalliques (acier inoxydable) et plastiques, céramiques, calcaires, etc.
  - Éviter le contact avec les métaux mous : aluminium, cuivre, zinc, nickel et alliages, etc.
  - En cas de doute, faire un test de compatibilité avec les autres matériaux avant un usage prolongé.
- Impact sur les eaux d'égout :
  - Teneur en phosphore : (% P) : 0.
  - Les tensioactifs présents dans cette préparation sont conformes aux critères de biodégradabilité requis dans le Règlement CE nº 648/2004 des détergents.
- Autorisation de mise sur le marché dans le cadre du Règlement (UE) 528/2012:
  - Produit biocide TP02 (nº inventaire 63240) - Désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides. Usage réservé aux professionnels.
- Registre biocide sur la DGSP nº 24-20-12196.

CONSEILS D'UTILISATION

Utilisé comme désinfectant du linge contaminé, le dosage dans la phase de décontamination doit être de 0,5-1,0 %, pour un temps de contact de 5-15 minutes et une température comprise entre 20 et 40 ºC.

MESURES DE PRÉVENTION

Consulter la fiche de données de sécurité.
Ne pas mélanger de produits chimiques purs.

Cette fiche est fournie à titre d'information.
Elle peut être modifiée sans préavis.
PROQUIMIA, S.A. décline toute responsabilité pour une utilisation non conforme.