FICHE TECHNIQUE

HYGIENE & DESINFECTION

HD10917

INDAL OXY SPE

Date de mise à jour : 01/12/2022 Version FT : 8.0

DESINFECTANT BACTERICIDE FONGICIDE SPORICIDE PRET A L'EMPLOI

AMM n° FR-2019-0071

INDAL OXY SPE est un désinfectant prêt à l'emploi bactéricide, levuricide, fongicide et sporicide
Désinfectant sans rinçage des surfaces, équipements et mobiliers propres, en milieux médical (sauf surfaces en contact avec les patients et personnels soignants), hospitalier et paramédical, institutionnel, tertiaire, hôtellerie, salles de sports et vestiaires, sanitaires, les industries pharmaceutiques, cosmétiques, biotechnologiques, les laboratoires, etc.
INDAL OXY SPE convient aussi pour la désinfection des surfaces et matériels en contact avec les denrées alimentaires (IAA, Métiers de la restauration...)
INDAL OXY SPE est formulé sans parfum.
Pour réduire l'impact environnemental, respectez les doses recommandées d'utilisation.

UTILISATIONS

Après un nettoyage des surfaces avec un détergent, le produit s'applique dans les conditions suivantes :
Appliquer le produit par pulvérisation à l'aide d'un matériel adapté et en quantité suffisante pour que les surfaces restent humides au moins pendant le temps de contact requis (si nécessaire, répartir le produit avec un chiffon humide). Temps de contact : 15 minutes pour l'efficacité contre bactéries, levures et moisissures, 60 minutes pour l'efficacité contre les bactéries sporulées et la mycobactérie de la tuberculose, 120 minutes pour l'efficacité virucide.

Type d'industrie	Méthode	Température d'utilisation	Concentration d'utilisation	Temps de contact
Collectivité. Industries agroalimentaires (Viande, poisson, salaison, lait, oeuf, fromage, boisson, plats cuisinés, panification, conserverie ...)	Surface par pulvérisation	Ambiante	Pur	15 à 60 min

Après le temps d'action nécessaire à l'efficacité recherchée, le rinçage à l'eau potable n'est pas obligatoire avant réutilisation des surfaces, si celles-ci sont laissées à sécher jusqu'à évaporation complète du produit ou si ces surfaces sont soigneusement essuyées.
Pulvérisation, TP 2 : Par calcul, pour une surface traitée < 0,5 m2, le délai de réentrée est de 125 min pour une pièce de 20 m3 avec 0,6 renouvellement d'air/h; de 58 min pour une pièce de 20 m3 avec 1,5 renouvellement d'air/h et possible réentrée immédiate dans une pièce de 80 m3 avec 1,5 renouvellement d'air/h. Pulvérisation, TP 4 : Par calcul, pour une surface traitée de 5 m2, le délai de réentrée est de 39 min pour une pièce de 80 m3 avec 5 renouvellements d'air/h et de 15 min pour 20 renouvellement/h; pour une surface traitée de 1 m2, une pièce de 25 m3 et 5 renouvellements d'air/h, le delai de réentrée est de 29 min. S'assurer que la concentration dans l'air ambiant est inférieure à 1,25 mg/m3 par l'utilisation d'un détecteur d'H2O2 avant d'autoriser la réentrée dans la pièce.

MATÉRIEL D'APPLICATION : STOCKMEIER vous propose un large catalogue réunissant toute une gamme de matériel dédié à l'application et au stockage de nos produits, rétention, soutirage, transfert, dosage, moussage, pulvérisation...
Demander une catalogue à votre technico-commercial ou écrivez-nous à baso@stockmeier.fr.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect	Limpide
Couleur	Incolore
Odeur	Caractéristique.
Matière(s) active(s)	Peroxyde d'hydrogène (n° CAS 7722-84-1) à 7,4% (75 g/litre)
Densité	1,02 (20°C)
pH pur	3 ± 1,0 (20°C)

STOCKMEIER FRANCE H&D
BP 89152 3 Rue de la Buhotière
35091 RENNES CEDEX 9 - FRANCE
Tel. : +33 (0)2 99 29 46 75
baso@stockmeier.fr - www.basoarvo.com / www.stockmeier.fr

Stockmeier France Hygiène et Désinfection est certifié
ISO 9001
ISO 14001

STOCKMEIER FRANCE

HD10917

INDAL OXY SPE

Date de mise à jour : 01/12/2022 Version FT : 8.0

pH à 1% dans l'eau distillée	Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique	1,11 mPa.s (20°C)
Pouvoir séquestrant à 1%	Aucune donnée disponible
Tension superficielle [N/m]	Aucune donnée disponible
DCO-valeur	Aucune donnée disponible
Teneur en azote	Aucune donnée disponible
Teneur en phosphore	Aucune donnée disponible
Point d'éclair	Ininflammable.
Température de stockage	0 – 30 °C
DDM (date durabilité minimum)	2 ans, voir conditionnement.

RÉGLEMENTATION

Autorisé pour le nettoyage des surfaces et objets en contact avec des denrées alimentaires selon l'arrêté du 19/12/13 modifiant l'arrêté du 08/09/99.
Conforme au cahier des charges du 28 décembre 2021 et complétant les dispositions des Règlements CE n° 2018/848 et 2021/1165 pour le nettoyage et la désinfection en industrie agroalimentaire et transformation biologique. (voir site www.inao.gouv.fr).

PROPRIETES BIOCIDES

Biocide selon le règlement UE 528/2012
AMM n° FR-2019-0071

MATIÈRE(S) ACTIVE(S) : Peroxyde d'hydrogène (n° CAS 7722-84-1) à 7,4% (75 g/litre)

Règlement Biocide 528/2012 UE. Type de produit (TP) n°

2 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
4 - Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

BACTERICIDIE - 100 % TP2, TP4
EN1276 - 15 min - 20°C, EN13727 - 15 min - 20°C, EN13697 - 15 min - 20°C, EN14561 - 15 min - 20°C, EN16615 - 15 min - 20°C - propreté.
Souches testées : *Listeria monocytogenes, Salmonella Typhimurium, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa.*
LEVURICIDIE, FONGICIDIE - 100 % TP2, TP4
EN1650 - 15 Min - 20°C, EN13624 - 15 min - 20°C, EN13697 - 15 min - 20°C, EN14562 - 15 min - 20°C, EN16615 - 15 min - 20°C - propreté.
0,3 g/l d'albumine bovine - conditions de propreté,3 g/l d'albumine bovine - conditions de saleté générales
Souches testées : *Candida albicans, Aspergillus brasiliensis.*
BACTERICIDIE - 100 % TP2, TP4
EN13623 - 15 min - 20°C - propreté. 0,05 g/l d'extraits de levure
Souches testées : *Legionella pneumophila.*
VIRUCIDIE - 100 % TP2, TP4
EN14476 - 90 min - 20°C - propreté. 0,3 g/l d'albumine bovine - conditions de propreté,3 g/l d'albumine bovine - conditions de saleté générales
Souches testées : *Poliovirus type 1, Adénovirus type 5, Norovirus murin.*
SPORICIDIE - 100 % TP2, TP4
EN13704 - 60 min - 20°C - propreté. 0,3 g/l d'albumine bovine - condition de propreté
Souches testées : *Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Clostridium sporogenes.*
TUBERCULOCIDIE - 100 % TP2
EN14563 - 60min - 20°C - propreté. 0,3 g/l d'albumine bovine - conditions de propreté
Souches testées : *Mycobacterium terrae.*

STOCKMEIER FRANCE H&D
BP 89152 3 Rue de la Buhotière
35091 RENNES CEDEX 9 - FRANCE
Tel. : +33 (0)2 99 29 46 75
baso@stockmeier.fr - www.basoarvo.com / www.stockmeier.fr

CONDITIONNEMENTS

Plusieurs conditionnements sont disponibles pour ce produit, pour plus d'informations sur ces conditionnements et les poids par conditionnement, veuillez contacter notre service commercial.

CONSIGNES DE SECURITE

Recommandations d'utilisation : Fiche de données de sécurité (FDS) sur demande. En cas d'urgence, contactez un centre anti-poison. L'emballage vide ne doit pas être réutilisé, il doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous la responsabilité du détenteur de ce déchet. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Ne pas se débarrasser du produit dans les canalisations ou dans l'environnement extérieur (sols, cours d'eau, etc ...). Informer le détenteur de l'AMM en cas d'inefficacité d'un traitement. Usage strictement réservé aux professionnels.
Précaution à prendre pour une manipulation sans danger, matières incompatibles, produits incompatibles : Se reporter aux chapitres 7.1, 7.2 et 8.2 de la fiche de données de sécurité.

Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver dans l'emballage d'origine fermé. Conserver à l'abri de la lumière solaire directe. Craint le gel.
Température de stockage : 0 – 30 °C

Ce produit est incompatible avec les matériaux type marbre, béton ou matériaux sensibles aux acides et oxydants. Réaliser un essai préalable sur les surfaces à traiter avant application, notamment l'aluminium.

TRAITEMENTS DES DECHETS

Traitement des déchets : Se reporter au chapitre 13 de la FDS

Motif de la mise à jour : Modifications réglementaires

Les fiches de données de sécurité sont envoyées par mail selon les dispositions réglementaires lors de l'expédition de nos produits. Elles sont également disponibles auprès de notre force de vente.
Les valeurs physicochimiques caractéristiques mentionnées sur cette fiche, hors chapitre spécifications de vente Stockmeier France, sont indicatives et non garanties, les spécifications et résultats des tests étant par ailleurs disponibles sur le certificat d'analyse. Le cas échéant, les concentrations indiquées au point "Propriétés biocides" représentent les concentrations biocides recommandées selon les tests d'efficacités réalisés par des laboratoires agréés. Ces dernières peuvent être adaptées selon les cas d'application. Votre commercial STOCKMEIER France se tient à votre disposition pour aborder ce sujet.
Les déclarations de ce document proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Elles ne dédouanent pas l'utilisateur de procéder à ses propres contrôles et sont rédigées sur la base de nos connaissances à la date de rédaction. Il appartient à l'acheteur et à l'utilisateur final le cas échéant, de s'assurer seuls et en dernier lieu de l'adéquation du produit au regard de l'usage prévu par leur secteur d'activité et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Litiges : Le tribunal de commerce de Rennes est seul compétent.

STOCKMEIER FRANCE H&D
BP 89152 3 Rue de la Buhotière
35091 RENNES CEDEX 9 - FRANCE
Tel. : +33 (0)2 99 29 46 75
baso@stockmeier.fr - www.basoarvo.com / www.stockmeier.fr

Stockmeier France Hygiène et Désinfection est certifié
ISO 9001
ISO 14001